

Bifasto

GROEP	3	7	FUNGICIDE
-------	---	---	-----------

Toelatingsnummer	15902 N
Wnr	W.3
Productgroep	Fungicide
Aard van het preparaat	Suspensie concentraat
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	difenoconazool (50 g/l) en fluxapyroxad (75 g/l)
UFI	U502-M0GH-500H-R08P

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	
Pictogram	   GHS07 GHS08 GHS09
Signaalwoord	WAARSCHUWING
Gevarenaanduidingen	<p>H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</p> <p>H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.</p> <p>H362 kan schadelijk zijn via de borstvoeding.</p> <p>H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>
Voorzorgsmaatregelen	<p>P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>P102 Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.</p> <p>P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.</p> <p>P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.</p>

	<p>P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P264 Na het werken met dit product met veel water en zeep grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen. P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.</p>
Aanvullende etiketelementen	<p>SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.</p>

STORL

STORL_Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: -

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering # middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *2 Mycosphaerella*3	0,6 L/ha	3 per 12 maanden	1,8 L/ha per 12 maanden	7	3
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet-eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *2 Mycosphaerella *3	0,6 L/ha	3 per teeltcyclus	1,8 L/ha per teeltcyclus	7	3
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *4	0,6 L/ha	2 per teeltcyclus	1,2 L/ha per teeltcyclus	7	3

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*2 Echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea* / *Podosphaera xanthii*, *Golovinomyces cichoracearum* / *Erysiphe cichoracearum*, *Leveillula taurica* / *Oidiopsis taurica*)

*3 *Mycosphaerella* (*Mycosphaerella melonis* / *Didymella bryoniae*)

*4 Echte meeldauw (*Leveillula taurica*, *Oidium neolycopersici*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering# middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Aardbei	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *1	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	7	1
Gerbera (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*6	1,0 L/ha	1,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
		Sclerotienrot*5	2,0 L/ha	2,0 L/ha				
Roos (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*7	1,0 L/ha	1,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
		Sclerotienrot*5	2,0 L/ha	2,0 L/ha				
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Snijbloemen (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Sclerotienrot*5 Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-
Snijbloemen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte, grond	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-

gebonden teelt)								
Veredeling en zaadteelt (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

*1 Echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*, *Podosphaera macularis* / *Sphaerotheca macularis*)

*5 Sclerotienrot (*Sclerotinia* spp.)

*6 Echte meeldauw (*Podosphaera xanthii* / *Oidium citrulli*)

*7 Echte meeldauw (*Podosphaera pannosa* / *Sphaerotheca pannosa*)

*8 Echte meeldauw (*Oidium* soorten, *Sphaerotheca* soorten, *Podosphaera* soorten, *Microsphaera* soorten, *Erysiphe* soorten)

*9 Roesten (*Puccinia* soorten, *Coleosporium* soorten, *Melampsora* soorten, *Uromyces* soorten, *Cronartium* soorten, *Phragmidium* soorten, *Gynosporangium* soorten)

Overige toepassingsvoorwaarden

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan bloemisterijgewassen (inclusief gerbera, roos, veredeling en zaadteelt).

In de teelt van vruchtgroenten van aardbei het middel toepassen vanaf stolon vorming (BBCH 40)

In de teelt van vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met eetbare schil en vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met niet-eetbare schil het middel toepassen in 200 tot 1500 liter water per ha.

In de teelt van vruchtgroenten van *Solanaceae* het middel toepassen in 400 tot 1500 liter water per ha.

In de teelt van bloemisterijgewassen (inclusief gerbera, roos, veredeling en zaadteelt) het middel toepassen in 500 tot 1500 liter water per ha.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

In de bedekte teelt van vruchtgroente van *Cucurbitaceae* met eetbare en niet-eetbare schil en vruchtgroente van *Solanaceae* verdient het, in verband met kans op gewasschade, aanbeveling om in de winterperiode (oktober - maart) met een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas / cultivar geen schade ondervindt van een behandeling met het middel.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen difenoconazool en fluxapyroxad. Difenconazool behoort tot de triazolen (DMI fungiciden). De Frac code is 3. Fluxapyroxad behoort tot de Succinate dehydrogenase remmers (SDHI). De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Gewassen

Komkommer

De dosering voor komkommer is op basis van een volgroeid gewas. Bij een toepassing op een onvolgroeid gewas verdient het de aanbeveling om een dosering van 40 ml per 100 L water aan te houden.

Voer bij een tankmix altijd eerst een proefbespuiting uit om te zien of het gewas de tankmix verdraagt.

Vruchtgroenten van *Solanaceae*

Bij een toepassing met <1000 L water per hectare, een dosering van 60 ml per 100 L water aanhouden.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.